

1. HIV jest:

- a) chorobą
- b) skrótem nazwy ludzkiego wirusa upośledzenia odporności
- c) skrótem nazwy organizacji międzynarodowej zajmującej się pomocą chorym na AIDS

2. Test wykrywający zakażenie HIV zalecany jest osobom:

- a) powracającym z krajów europejskich
- b) często zmieniającym partnerów seksualnych
- c) często podróżującym samolotem

3. Czy istnieje szczepionka przeciw HIV?

- a) TAK, ale uodparnia tylko 40% populacji
- b) TAK, ale uodparnia tylko czasowo
- c) NIE, dotychczas nie wynaleziono szczepionki przeciw HIV

4. Czy można po wyglądzie rozpoznać, że ktoś jest nosicielem wirusa HIV?

- a) nie, osób seropozytywnych nie można rozpoznać na podstawie wyglądu
- b) tak, osoby seropozytywne mają charakterystyczną wysypkę
- c) tak, osobom seropozytywnym wypadają włosy i drżą ręce

5. Człowiek chory na AIDS:

- a) umiera najczęściej w ciągu roku od momentu zakażenia wirusem HIV
- b) może żyć wiele lat, a umiera z powodu chorób wynikających z upośledzenia odporności
- c) umiera zawsze w ciągu siedmiu lat od momentu zakażenia wirusem HIV

6. AIDS jest angielskim skrótem nazwy choroby. Skrót tłumaczy się na język polski jako:

- a) wirusowe zapalenie wątroby typu A
- b) zespół chorób układu immunologicznego
- c) zespół nabytego upośledzenia odporności

7. „Okienko serologiczne” to:

- a) okres pomiędzy wniknięciem HIV do organizmu a wytworzeniem przeciwciał anty HIV, które mogą być wykryte testem
- b) okres pomiędzy wniknięciem HIV do organizmu a rozwinięciem się objawów AIDS
- c) okres pomiędzy wniknięciem HIV do organizmu a zniszczeniem pierwszej komórki żywiciela

II. Zaznacz znakiem X, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Nr pytania	Treść stwierdzenia	PRAWDA	FAŁSZ
8	Wirus HIV zawiera w swoim rdzeniu cząsteczkę DNA		
9	Wirus HIV może być przenoszony przez komary i inne owady żywiące się krwią		
10	Osoby, które wiedzą o swoim zakażeniu wirusem HIV objęte są nowoczesną terapią antyretrowirusową, która zapobiega wystąpieniu AIDS		
11	Pierwsze przypadki zachorowań na AIDS zaobserwowano w USA na początku lat 80-tych XX wieku		
12	Podczas pierwszego stosunku płciowego w życiu nie można zakażać się wirusem HIV		
13	Osoba, u której nie stwierdzono obecności wirusa HIV jest określana jako "seronegatywna"		
14	Bycie dawcą krwi grozi zakażeniem wirusem HIV		

III. Zaznacz trzy poprawne odpowiedzi w każdym pytaniu

15. Matka zakażona wirusem HIV może zakażać swoje dziecko:

- a) podczas kąpieli noworodka, gdyż wirusy są na jej dłoniach
- b) podczas karmienia piersią, ponieważ wirus znajduje się w jej mleku *
- c) podczas porodu, gdyż wirusy są w jej krwi *
- d) podczas przytulania, ponieważ wirusy znajdują się na jej skórze
- e) podczas ciąży, gdyż wirus przenika przez łożysko *

16. Do tak zwanych zachowań ryzykownych zalicza się:

- a) utrzymywanie stosunków płciowych z wieloma partnerami *
- b) stosowanie prezerwatyw podczas stosunków płciowych
- c) przyjmowanie dożylnie narkotyku przez kilka osób tym samym sprzętem *
- d) wykonywanie tatuaży przez przypadkowe osoby igłami wielokrotnie używanymi bez sterylizacji *
- e) pływanie w publicznym basenie
- f) mieszkanie i korzystanie z tych samych naczyń z osobami seropozytywnymi

7. Przed zakażeniem wirusem HIV chronią:

- a) znajomość dróg transmisji wirusa
- b) unikanie kontaktów towarzyskich z osobami seropozytywnymi
- c) utrzymywanie stosunków płciowych z wieloma partnerami
- d) stosowanie prezerwatyw podczas stosunku płciowego z nowo
- e) wyłącznie heteroseksualna aktywność płciowa
- f) wierność jednemu/jednej zdrowemu/zdrowej partnerowi/partnerce

18. Człowiek zakażony HIV:

- a) może być dawcą wszystkich narządów oprócz krwi
- b) może pracować z osobami zdrowymi i uczestniczyć w życiu publicznym
- c) może być dawcą tylko wątroby
- d) może mieszkać z osobami seronegatywnymi nie stanowiąc dla nich zagrożenia
- e) nie może być dawcą żadnych narządów i tkanek

f) nie może uprawiać sportów związanych z dużym wysiłkiem

19. Kto powinien zrobić test na HIV?:

- a) osoba, która podczas kontaktów seksualnych nie stosowała prezerwatyw
- b) osoba, która podczas pobytu w szpitalu dostawała krew
- c) osoba, która wykonywała np. tatuaż lub założenie kolczyków (piercing) poza renomowanymi salonami, gdzie przestrzega się rygorystycznych standardów higieny
- d) osoba, która przeżyła poważną operację
- e) osoba, która przyjmowała zastrzyki zlecone przez lekarza
- f) kobieta planująca ciążę oraz jej partner, przyszły ojciec ich dziecka/dzieci

26. Zaznacz choroby zakaźne towarzyszące AIDS:

- a) pierwotniakowe zapalenie płuc
- b) zakażenie wirusem opryszczki
- c) mukowiscydoza
- d) zawał serca
- e) zakażenia grzybicze przełyku, tchawicy, oskrzeli, płuc
- f) mięsak Kaposiego
- g) anemia sierpowata

Klucz odpowiedzi do testu konkursowego

Nr pytania	Poprawna odpowiedź	Punktacja
1	b	1
2	b	1
3	c	1
4	a	1
5	b	1
6	c	1
7	a	1
8	FAŁSZ	1
9	FAŁSZ	1
10	PRAWDA	1
11	PRAWDA	1
12	FAŁSZ	1
13	PRAWDA	1
14	FAŁSZ	1
15	b c e	3
16	a c d	3
17	a d f	3
18	b d e	3
19	a c f	3
20	a b e	3

Uwaga: W zadaniach 15-20, jeśli uczeń zaznaczy więcej niż trzy odpowiedzi, uzyskuje 0 punktów za to zadanie